

Κολποσκόπηση - βιοψία τραχήλου

Είναι η εξέταση του τραχήλου (αιθήλα και του συνόλου των έξω γεννητικών οργάνων) με ένα ειδικό ιατρικό μηχανήμα, το κολποσκόπιο

που επιτρέπει τη λεπτομερή εξέταση της περιοχής.

Είναι μια ανώδυνη και απλή εξέταση που συνιστάται στις παρακάτω περιπτώσεις:

παθολογικό τεστ Παπ, παρουσία HPV ιού, κονδυλώματα, τραχηλίτιδα, πόνος, αιμορραγία. Η βιοψία

τραχήλου συνοδεύει την κολποσκόπηση σε ορισμένες περιπτώσεις όταν υπάρχουν παθολογικά ευρήματα.

Με τη βιοψία και την ιστολογική εξέταση που ακολουθεί αποκτούνται επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την περαιτέρω αντιμετώπιση της ασθενούς πχ παρακολούθηση ή σύσταση για κωνοειδή εκτομή τραχήλου.


Κωνοειδής εκτομή τραχήλου

Είναι μια επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται ένα τμήμα τραχήλου σε βάθος και έκταση ανάλογα με την περίπτωση (π.χ.

βαρύτητα και έκταση βλάβης, ηλικία ασθενούς, επιθυμία για τεκνοποίηση κλπ). Η επέμβαση γίνεται με τοπική ή με ελαφρά γενική αναισθησία.

Η εκτομή του τραχήλου γίνεται με τη χρήση διαθερμίας ή laser και συνήθως δεν απαιτείται νυστέρι ή ράμματα.

Η νοσηλεία διαρκεί λίγες ώρες και η ασθενής επιστρέφει στην εργασία της την επόμενη μέρα. Μικρή κολπική αιμορραγία παρατηρείται για 2-4 εβδομάδες μετά την επέμβαση.



Εμβόλιο κατά του ιού HPV

Το 2006 άρχισε παγκοσμίως ο εμβολιασμός κατά του ιού HPV μετά από πολυετείς μελέτες. Με το εμβόλιο αυτό εγκαινιάζεται μια νέα εποχή πρόληψης του καρκίνου και των προκαρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας, του αιδοίου και του κόλπου.

Επιπλέον, το τετραδύναμο εμβόλιο, προφυλάσσει και από τα κονδυλώματα.

Σήμερα, υπάρχουν διαθέσιμα διεθνώς, δύο είδη εμβολίων κατά του HPV:

1. Το "Gardasil" είναι τετραδύναμο εμβόλιο κατά των ογκογόνων τύπων HPV 16 και 18 και των τύπων 6 και 11, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των κονδυλωμάτων.
2. Το "Cervarix", διδύναμο εμβόλιο κατά των τύπων HPV 16 και 18.

Το εμβόλιο απευθύνεται αρχικά σε κορίτσια 9-15 ετών και γυναίκες 16-26 ετών (στις ηλικίες 12-26 ετών διατίθεται δωρεάν μέσω του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού). Επιπλέον, το τετραδύναμο εμβόλιο πρόσφατα εγκρίθηκε και για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας (έως 45 ετών).



Κέντρο Γυναικολογίας & Γονιμότητας

ΗΛΙΑΣ Γ. ΤΣΑΚΟΣ

MD(Hons), MRCOG, DFFP, CST

Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος

Αδριανουπόλεως 6, Μέγαρο "Βυζάντιο"

551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 402400 - 2310 402070, Fax: 2310 402661

E-mail: tsakos@hol.gr

www.gynfert.gr

Τεστ Παπανικολάου

Νεότερες εξελίξεις

Με σεβασμό
στον
άνθρωπο

Κολποσκόπηση - βιοψία τραχήλου

Είναι η εξέταση του τραχήλου (αιθήλα και του συνόλου των έξω γεννητικών οργάνων) με ένα ειδικό ιατρικό μηχανήμα, το κολποσκόπιο που επιτρέπει τη λεπτομερή εξέταση της περιοχής.




Είναι μια ανώδυνη και απλή εξέταση που συνιστάται στις παρακάτω περιπτώσεις:
παθολογικό τεστ Παπ, παρουσία HPV ιού, κονδυλώματα, τραχηλίτιδα, πόνος, αιμορραγία. Η βιοψία

τραχήλου συνοδεύει την κολποσκόπηση σε ορισμένες περιπτώσεις όταν υπάρχουν παθολογικά ευρήματα.

Με τη βιοψία και την ιστολογική εξέταση που ακολουθεί αποκτούνται επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την περαιτέρω αντιμετώπιση της ασθενούς πχ παρακολούθηση ή σύσταση για κωνοειδή εκτομή τραχήλου.

Κωνοειδής εκτομή τραχήλου

Είναι μια επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται ένα τμήμα τραχήλου σε βάθος και έκταση ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. βαρύτητα και έκταση βλάβης, ηλικία ασθενούς, επιθυμία για τεκνοποίηση κλπ). Η επέμβαση γίνεται με τοπική ή με ελαφρά γενική αναισθησία.



Η εκτομή του τραχήλου γίνεται με τη χρήση διαθερμίας ή laser και συνήθως δεν απαιτείται νυστέρι ή ράμματα.

Η νοσηλεία διαρκεί λίγες ώρες και η ασθενής επιστρέφει στην εργασία της την επόμενη μέρα. Μικρή κολπική αιμορραγία παρατηρείται για 2-4 εβδομάδες μετά την επέμβαση.

Εμβόλιο κατά του ιού HPV

Το 2006 άρχισε παγκοσμίως ο εμβολιασμός κατά του ιού HPV μετά από πολυετείς μελέτες. Με το εμβόλιο αυτό εγκαινιάζεται μια νέα εποχή πρόληψης του καρκίνου και των προκαρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας, του αιδοίου και του κόλπου.

Επιπλέον, το τετραδύναμο εμβόλιο, προφυλάσσει και από τα κονδυλώματα.

Σήμερα, υπάρχουν διαθέσιμα διεθνώς, δύο είδη εμβολίων κατά του HPV:

1. Το "Gardasil" είναι τετραδύναμο εμβόλιο κατά των ογκογόνων τύπων HPV 16 και 18 και των τύπων 6 και 11, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των κονδυλωμάτων.
2. Το "Cervarix", διδύναμο εμβόλιο κατά των τύπων HPV 16 και 18.

Το εμβόλιο απευθύνεται αρχικά σε κορίτσια 9-15 ετών και γυναίκες 16-26 ετών (στις ηλικίες 12-26 ετών διατίθεται δωρεάν μέσω του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού). Επιπλέον, το τετραδύναμο εμβόλιο πρόσφατα εγκρίθηκε και για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας (έως 45 ετών).

Τεστ Παπανικολάου

Νεότερες εξελίξεις

Με σεβασμό
στον
άνθρωπο

